

# ARCCIT 9 (Nadorcott LS)


## INFORMAZIONI GENERALI

|   |  |
|---|--|
| <b>Genere</b>                               | Mandarino  |
| <b>Origine</b>                              | Mutazione Indotta di Nadorcott presso l'ARC-ITSC di Addo, South Africa |
| <b>Diritti di privativa dei costitutori</b> | Status: Protezione Provvisoria del CPVO*                               |
| <b>Posizione</b>                            | IVIA, Spagna   |

\*Vedi la descrizione dello status sul sito internet [www.citrogold.co.za](http://www.citrogold.co.za)

## TEST DI QUALITÀ INTERNA RELATIVA

| Varietà/<br>Portinnesto | Peso<br>del frutto<br>(gr) | Succo<br>% | Contenuto<br>di zuccheri<br>(°Brix) | Acidità<br>% | Rapporto di<br>maturazione | BrimA |
|-------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-------|
| Nadorcott               |                            | 50-60      | 11-15                               | 0,8-1,5      | 10-15                      |       |
| Nadorcott A9            |                            | 50-60      | 11-15                               | 0,8-1,5      | 10-15                      |       |
| Nova                    |                            | 48-52      | 11-14                               | 0,7-1,3      | 10-17                      |       |



## CARATTERISTICHE DELLA PIANTA

|  |   |
|--|---|
| <b>Portinnesti suggeriti</b>                         | Citrango Carrizo, C35, MxT, Troyer, Sunki Bourke, Benton e X639 |
| <b>Caratteristiche della pianta</b>                  | Portamento assurgente, vigoroso e precoce; senza spine          |
| <b>Produzione alternata</b>                          | Gestire la produzione per ridurre l'alternanza                  |
| <b>Suscettibilità ad <i>Alternaria alternata</i></b> | Molto tollerante  |

## CARATTERISTICHE DEL FRUTTO

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Dimensioni del frutto</b>        | Calibri 3 - 1X (55 - 68 mm)   |
| <b>Forma del frutto</b>             | Oblata con occasionale lobo pedicellare   |
| <b>Caratteristiche della buccia</b> | Liscia. Arancione intenso a maturazione. Facile da sbucciare con un basso contenuto di oli essenziali nella buccia.   |
| <b>Caratteristiche della polpa</b>  | Arancione brillante, con l'asse carpellare aperto. L'albedo ha una leggera colorazione rosa.  |
| <b>Semi</b>                         | In condizioni di impollinazione incrociata: il contenuto di semi varia tra 0 e 0,04 semi nelle zone meridionali del Sudafrica e tra 0,1 e 1,5 semi nelle zone settentrionali. In condizioni di isolamento: praticamente senza semi. |
| <b>Commenti</b>                     | La frutta risponde bene alla sterilizzazione a freddo e alla frigoconservazione   |

## CALENDARIO DI MATURAZIONE (Emisfero Settentrionale)

| Novembre |    |    | Dicembre |    |    | Gennaio      |    |    | Febbraio |    |    | Marzo |    |    |
|----------|----|----|----------|----|----|--------------|----|----|----------|----|----|-------|----|----|
| 10       | 20 | 30 | 10       | 20 | 30 | 10           | 20 | 30 | 10       | 20 | 30 | 10    | 20 | 30 |
| Nova     |    |    |          |    |    |              |    |    |          |    |    |       |    |    |
|          |    |    |          |    |    | Nadorcott A9 |    |    |          |    |    |       |    |    |
|          |    |    |          |    |    |              |    |    |          |    |    | Orri  |    |    |

Variety Innovation B.V.  
Herengracht 449A  
1017BR Amsterdam

t: +27 (0)82 894 5938  
e: [peter@sorelikiwi.com](mailto:peter@sorelikiwi.com)

[www.variety-innovation.com](http://www.variety-innovation.com)



ARCCIT 9 v1\_07-04-2025  
COPYRIGHT © 2025