

# SemeonPro™ PHEROMONES



Feromoon voor het signaleren en monitoren van:

## Nesidiocoris *tenuis*

♀♂

### PheroNesi™

**Algemene informatie:**

De roofwants *Nesidiocoris tenuis* is van mediterrane origine, maar komt tegenwoordig in veel regio's voor, omdat hij werd ingezet als een efficiënte roofwants voor de biologische bestrijding van kas-wittevlieg (*Trialeurodes vaporariorum*), tabakswittevlieg (*Bemisia tabaci*) en de tomatenmineermot eieren (*Tuta absoluta*). In regio's met een klimaat als in Nederland en België overleven ze de winter niet en komen dan alleen voor in kassen. Het probleem is dat *Nesidiocoris tenuis* schade geeft aan vruchten en ringen laat verschijnen op de stengels.

HortiPro heeft PheroNesi™ ontwikkeld en dit feromoon lokt adulte Nesi roofwantsen. PheroNesi™ lokt zowel mannelijke als vrouwelijke adulten.

**Toepassing:**

Het signaleren en monitoren van de plaag van de *Nesidiocorus tenuis* m.b.v. de PheroNesi™:

1 - 2 gele HortiPro vangplaten per 1.000 m<sup>2</sup>

10 - 20 gele HortiPro vangplaten met per hectare

Een hoge plaagdruk vraagt om intensieve monitoring. Dan adviseren wij de volgende aantallen te gebruiken:

10 - 25 gele HortiPro vangplaten per 1.000m<sup>2</sup>

100 - 250 gele HortiPro vangplaten per hectare

**Werkwijze:**

- Gebruik gele HortiPro vangplaten of vergelijkbaar bij voorkeur zonder bedrukking en rasters.
- Steek de PheroNesi-dispenser tot aan het dopje in een 14 millimeter gat.
- Verdeel de platen gelijkmatig over de oppervlakte van de kas.
- Bij plaatsing boven het gewas de vangplaten aan de rollertrap linten nieten.
- Indien er niet gewerkt wordt met rollertraps dan de vangplaten aan de kaspoten hangen m.b.v. een magneethaak.
- Aangezien de *Nesidiocoris tenuis* zich vaak in de koppen van het gewas ophoudt verdient plaatsing van de vangplaten aan de rollertrap linten boven het gewas de voorkeur.

**Werking:**


De *Nesidiocoris tenuis* wantsen blijven plakken aan de gele vangplaten. Vervang de vangplaat als deze vol is.

De PheroNesi™ feromonen gaan 6-8 weken mee en kunnen met de handen aangeraakt worden.

De *Macrolophus pygmaeus* kan ook op de gele vangplaat af komen.



**Geadviseerde vallen:**



+4C°  
-18C°



2 jaar

